

ALLEGATO 1 alla Deliberazione . del

ADEGUAMENTO OFFERTA VACCINALE E NUOVA SCHEDULA VACCINALE ANTIMENINGOCOCCO

Introduzione

Le patologie invasive da meningococco costituiscono una seria minaccia alla salute; tra le malattie prevenibili mediante vaccino, sono percepite dalla popolazione come fra le più drammatiche. Anche i relativi pochi casi di malattia, rappresentano infatti un evento che è gravato da un'elevata probabilità di morte e di sequele permanenti.

La ASL di Nuoro intende garantire l'offerta dei vaccini antimeningococcici disponibili attraverso modalità diversificate, in considerazione delle normative di riferimento, dell'andamento epidemiologico e della fascia di età dei soggetti interessati.

I vaccini antimeningococcici attualmente disponibili sono:

- il vaccino antimeningococcico C
- il vaccino antimeningococcico coniugato ACWY
- il vaccino antimeningococcico B

Nel rispetto delle indicazioni delle relative schede tecniche relative all'età e delle altre variabili, le modalità di offerta sono le seguenti:

- Attiva e gratuita
- Gratuita, su richiesta
- In copagamento, su richiesta

Vaccinazione antimeningococco C con vaccino coniugato

E' prevista la somministrazione di una dose di vaccino antimeningococco C nel secondo anno di vita fra il tredicesimo e il quindicesimo mese di vita.

Tra il secondo ed il sesto anno di vita è prevista, in ogni occasione utile, la verifica ed il recupero dei bambini non vaccinati, ai quali sarà somministrata la prima dose di vaccino.

Inoltre, al fine di incidere maggiormente sulla diffusione delle malattie invasive da meningococco, nella fascia di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni, preferenzialmente a 12 anni, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni, è opportuno:

a) la verifica ed il recupero dei soggetti non vaccinati in età infantile, con offerta attiva e gratuita di una dose singola di vaccino coniugato ACWY

b) l'offerta attiva e gratuita di 1 dose (booster) con vaccino coniugato ACWY agli adolescenti già vaccinati nell'infanzia.
La vaccinazione coniugata quadrivalente sarà inoltre offerta gratuitamente in singola dose, dopo l'anno di età, ai soggetti a rischio di qualunque età indicate nel paragrafo "categorie a rischio".

Vaccinazione antimeningococco B

La vaccinazione contro il meningococco B consta di 4 dosi: la prima si somministra a metà del terzo mese di vita (76° giorno di vita, 15 giorni dopo esavalente+pneumo), la seconda a metà del quarto mese di vita (106° giorno di vita, 1 mese dopo la prima dose di Men B), la terza all'inizio del sesto mese di vita (151° giorno di vita, 1 mese dopo la seconda dose di esavalente+pneumo), la quarta al tredicesimo mese di vita (15 giorni dalla terza dose di esavalente+ pneumo). In caso di ritardo la dose di richiamo deve essere somministrata entro i 24 mesi di età

Tale modalità di offerta è destinata a tutti i nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2017, in modalità attiva e gratuita.

Per i soggetti che hanno già compiuto i sei mesi di vita e fino ai 23 mesi la vaccinazione contro il meningococco B consta di 3 dosi: la prima si somministra 1 mese dopo la seconda dose di esavalente+pneumo e la seconda dopo almeno due mesi dalla prima, la terza fra i 12 e 23 mesi di vita.

Tale modalità di offerta è destinata a tutti i nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2016, in modalità gratuita.

Categorie a rischio

La vaccinazione routinaria contro meningococco C e B dovrà essere affiancata dall'identificazione e l'immunizzazione dei soggetti a rischio di infezione invasiva meningococcica perchè affetti dalle seguenti patologie o condizioni di vita:

- a) talassemia e anemia falciforme
- b) asplenia post-traumatica
- c) altre cause di asplenia
- d) condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi)
- e) diabete mellito tipo 1
- f) malattie polmonari croniche
- g) insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min
- h) alcoolismo cronico
- i) infezione da HIV
- j) immunodeficienze congenite

- k) malattie epatiche croniche gravi
- l) perdita di liquido cerebrospinale
- m) difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9)
- n) difetti dei toll like receptors di tipo 4
- o) difetti della properdina
- p) altre patologie con difetto dell'immunità innata
- q) trapiantati o candidati al trapianto
- r) riceventi fattori della coagulazione concentrati
- s) situazione epidemiologica ad alto rischio su valutazione del Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL.*

* (ad esempio: l'offerta gratuita, su richiesta, della vaccinazione contro il meningococco C agli studenti fuori sede delle Università presenti in aree o situazioni considerate a rischio)

Recenti riscontri epidemiologici che dimostrano infezioni da sierotipi di meningococco diversi dal C e dal B anche nel nostro Paese (esempio da Y e W 135) rendono opportuno l'utilizzo nei soggetti a rischio del vaccino coniugato tetravalente ACW135Y.

Nei casi di cui alla lettera c), i), m) è necessario somministrare 2 dosi a distanza di 8 settimane una dall'altra. Si sottolinea che gli studi di efficacia di questo vaccino, riportati in scheda tecnica, riguardano persone fino a 55 anni di età.

In caso di splenectomia, il vaccino deve essere comunque somministrato anche se era stato già somministrato con il calendario routinario dell'infanzia.

Sono esclusi dall'offerta gratuita i viaggiatori internazionali per i quali la vaccinazione non è a carico del SSN ma resa disponibile in co-pagamento secondo il tariffario aziendale, approvato con Delibera n. del .

Eventuali richieste di vaccinazione antimeningococcica al di fuori delle categorie e delle fasce di età individuate e sempre nel rispetto delle indicazioni delle schede tecniche saranno effettuate in co-pagamento secondo il tariffario aziendale, approvato con Delibera n. del .

Legenda:

DTPa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare

IPV: vaccino antipolio inattivato

HBV: vaccino anti epatite B

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

MPRVar: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella

PCV: vaccino antipneumococcico coniugato

Men C: vaccino antimeningococcico C coniugato

Men ACWY: vaccino antimeningococcico quadrivalente coniugato ACWY

Men B: vaccino antimeningococcico B

Var: vaccino antivaricella

Interpretazione delle indicazioni di offerta per età:

3° mese: dal 61° giorno di vita

4° mese: dal 91° giorno di vita

6° mese: dal 151° giorno di vita

13 ° mese: dai dodici mesi compiuti (12 mesi+1 giorno)

5-6 anni: dai 5 anni compiuti ai 7 non compiuti